



Grandes Cultures

DLP 20-6-96-17045

Champagne-Ardenne

Bulletin n°325 du 15/06/96 : 1 page

d'après les observations des 13 et 14/06/1996

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Imprimerie du SRPV Champagne-Ardenne - Le Directeur-Gérant : D. PINCONNET - CFPAP n° 529 AD (© SPV 1989) - ISSN 0295-5776

Service Régional de la Protection des Végétaux
62 Avenue Nationale - La Neuville
BP 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Tel : 26.09.06.43 Fax : 26.87.14.64 ou 26.87.39.33
Toute reproduction même partielle est soumise
à notre autorisation

POIS

Jeunes gousses plates à gousses pleines du 2ème niveau fructifère.

Tordeuse

L'activité de la tordeuse est toujours aussi intense. Les captures de papillons sont encore nombreuses (sur certains postes, on atteint les 600 captures cumulées) et l'activité de ponte se poursuit avec des éclosions parfois massives de chenilles.

Captures cumulées au 14 juin

Lieu	Nombre total
08 Le Thour	277
10 Villery	607
St Pouange	392
Charny le Bachot	246
Bar sur Seine	249
51 Songy	129
Togny aux Boeufs	133

Quelques nouveaux comptages réalisés hier montrent encore des pontes fraîches et des chenilles au stade baladeur.

Comptages sur 25 plantes

Lieu	pontes fraîches	chenilles
Bar/Seine	19	5
St Pouange	27	26

■ **Nos conseils :** les traitements réalisés il y a 8 jours ont été efficaces à 85% sur les tout premiers étages. Cependant les derniers étages ne sont pas protégés et sur nos essais, l'efficacité globale (plante entière) n'est que de 47%. Aussi un

renouvellement est indispensable si vous désirez protéger l'ensemble de la plante. Choisir les heures les moins chaudes de la journée pour bénéficier d'une meilleure efficacité des pyréthrinoides.

Pucerons

Les vols de populations de pucerons verts se poursuivent et les captures en bacs jaunes sont parfois nombreuses. Cependant, peu de colonies d'aptères sont encore observées. Les populations restent très variables d'une parcelle à l'autre : certaines sont proches du seuil, d'autres sont indemnes de pucerons.

■ **Nos conseils :** un insecticide est à appliquer lorsque les populations sont en croissance rapide et que le seuil de 20 à 30 pucerons par plante est atteint. Attention : lorsque vous avez utilisé une matière active spécifique pucerons (Serk EC, Pirimor G...) il ya une dizaine de jours, celle-ci n'est pas ou très peu efficace contre les tordeuses.

Cécidomyie

Le vol se poursuit et les captures en bacs jaunes sont de l'ordre d'une quinzaine par jour. Des galles sont observées sur les boutons floraux terminaux dans les parcelles plus tardives au niveau stade ; ces galles sont remplies de larves. Ce sont donc essentiellement les derniers étages qui sont touchés ce qui ne devrait pas compromettre le rendement.

■ **Nos conseils :** pas de traitement à ce stade du pois.

**2ème SPECIAL
RAVAGEURS POIS:
renouvellement de
l'anti-tordeuse du
pois pour protéger
les étages
intermédiaires et
supérieurs.**

726

4° 30' 03" 153

